

SIMPLIFIER L'HYGIENE TRAITE SUR DES VACHES A LA PATURE

« Ce printemps, pour la mise à l'herbe, je souhaite réduire l'hygiène de traite afin d'économiser du temps d'astreinte.

Quels critères dois-je surveiller pour garantir une bonne qualité de mon lait ? »

Un éleveur du Jura



Le temps de traite dépend évidemment de l'installation, des pratiques et de l'organisation, du matériel dont vous disposez, de la configuration de la salle de traite mais aussi de l'hygiène de traite que vous pratiquez. La réduction de cette dernière ne peut pas se faire à la légère et demande que plusieurs facteurs soient réunis. Cette simplification ne convient pas à tous les élevages. Rappelons aussi que la suppression du nettoyage des trayons entraîne des traites plus longues par manque de stimulation de la mamelle. Cette stimulation essentielle pour l'éjection du lait peut se faire par voie sèche (papier ou laine de bois).

Une qualité irréprochable Avant toute réduction de vos actions d'hygiène, assurez-vous de la bonne santé mammaire de votre troupeau. Faites un point précis de votre situation actuelle au niveau de la qualité de votre lait (comptage cellulaire, germes totaux, butyriques et lactofermentation), le nombre de mammites détecté récemment et l'état de propreté de vos vaches. Se situer à moins de 200 000 cellules est un préalable. Assurez-vous également du bon état de la peau des trayons. Ils ne doivent pas présenter de gerçures, de blessures et de verrues. Ces lésions, si elles sont déjà présentes avant la réduction de votre protocole d'hygiène, risquent de ne pas s'arranger voire s'aggraver et par conséquent entraîner des difficultés de traite des animaux (trayons douloureux) et influencer sur la qualité du lait (présence de staphylocoques)

De bonnes conditions de pâturage



Si ces facteurs qualité du lait et cosmétique des trayons sont réunis, assurez-vous des bonnes conditions de pâturage de votre troupeau. Veillez à la portance de vos terrains. Préférez des parcelles sur lesquelles vous savez que vos animaux n'enfoncent pas et sur lesquelles le ressuyage des sols est rapide. Surveillez enfin l'accès à vos pâtures et à la sortie de votre bâtiment. Aménagez les pour éviter que les animaux se salissent lors des va et vient liés aux mises en pâture. Toutes ces recommandations environnementales vont influencer sur la propreté de vos vaches et de leurs trayons. Ces derniers, s'ils sont souillés par la terre ou la bouse, peuvent vous entraîner de graves répercussions sur la qualité de votre lait en termes de comptage bactériologique (germes totaux) et en comptage butyrique.

Surveillance Si tous ces critères sont réunis, vous pouvez alléger vos pratiques d'hygiène de traite. Toutefois rester à tout instant très vigilant sur tous ces aspects et surveiller sans cesse l'évolution de ces facteurs. Si l'un d'eux change, adaptez vos pratiques en fonction des résultats qualité du lait et sanitaire du troupeau. Par contre si les résultats s'altèrent sensiblement et ou si vous constatez des modifications des conditions de traite (cosmétique des trayons qui se dégrade, mammites, résultats qualité moins bons.....) revenez sur les techniques que vous pratiquiez avant.