




## LUTTER CONTRE LES STAPHYLOCOQUES

De plus en plus d'élevages connaissent des problèmes de qualité de lait liés à l'augmentation de staphylocoque dans le lait. Le plus courant dans nos élevages est le **staphylocoque doré (staphylococcus aureus)**. Il est possible de les limiter voire de les éviter en respectant quelques consignes simples.

La provenance des staphs est très variée. Ci-après sont présentés les **causes** et leurs **conséquences** ainsi que quelques **consignes et conseils** pour prévenir et limiter le développement des staphylocoques.



**LA PEAU  
LES PLAIES**

Prolifération des staphs par d'autres plaies ou infections présentes sur l'animal

- Eviter les plaies proches ou sur la mamelle
- Soigner et faire attention aux autres infections : métrite, parinaris, ...

**L'HOMME**

10 à 50 % des hommes sont porteurs sains de staphylocoques

- Laver les mains systématiquement avant chaque traite
- Traire avec des gants en nitrile
- Traire avec une tenue adaptée et propre



**LE MATERIEL**

Mauvais entretien du matériel et des moyens utilisés pour traire

- Laver régulièrement et efficacement l'extérieur des griffes en fin de traite et pendant traite si projection de bouses
- Si lavage automatique, faire attention aux temps de contacts et aux températures d'eau pour votre lavage machine à traire et tank

**L'ENVIRONNEMENT**

Les blessures que peuvent se faire les vaches dans les bâtiments et au pâturage pour être des sources de provenance des staphylocoques.

- Au niveau du bâtiment : Faire attention aux lieux de couchage, aux cornadis, aux brasseurs placés au milieu des fosses caillebotis sans protection, ...
- Au niveau du pâturage : Entretien des abords (ronce, bois, ...); entretenir les clôtures (éviter les barbelés qui traînent, ...)
- Réaliser un vide sanitaire par an