




Réussir son tarissement pour maîtriser la qualité du lait

Le tarissement est une période très importante pour la lutte contre les cellules et pour préparer la future lactation. Il a pour but de reposer la glande mammaire et de guérir les infections subcliniques de la mamelle.

Cette période doit être surveillée et maîtrisée. Les animaux taris ne doivent pas être les parents pauvres du troupeau, bien au contraire !!!



Quel antibiotique choisir ?

La période sèche est une période à risques élevés pour l'animal en termes de contamination de la mamelle par plusieurs familles de germes. Les conditions de logement des vaches taris, l'ambiance générale des bâtiments, l'état de santé de l'animal et le niveau cellulaire au tarissement sont des facteurs qui vont influencer le choix d'un antibiotique, son spectre d'action et sa durée d'action.


Procédez, à l'aide de votre vétérinaire, à des profils bactériologiques et des antibiogrammes pour définir le type de germes présent dans la mamelle et ainsi adapter votre produit de tarissement. Le traitement a deux intérêts :

- Curatif pour soigner les vaches infectées de longue durée ou qui ont beaucoup de cellules (infections par des pathogènes majeurs).
- Préventif pour empêcher l'apparition de mammites pendant la période sèche et donc la lactation suivante.

La durée :

Celle-ci est modulable en fonction de plusieurs objectifs. Cette durée doit être de 60 jours pour tous les animaux. Elle ne doit pas être inférieure à 60 jours pour plusieurs raisons :

- Durée d'action des produits de tarissement
- Un tarissement court entraîne de modification de production : moins de lait, TB et TP supérieurs



Une durée supérieure n'a pas d'impact favorable sur les comptages cellulaires de l'animal. Bien au contraire quelques fois si les conditions d'hygiène ne sont pas optimum pendant la période sèche.

Gérer le risque « inhibiteurs » :

- ⇒ Noter la date de tarissement sur le cahier sanitaire.
- ⇒ Attention aux délais d'attente si il y a un vêlage précoce (entre 45 et 60 jours d'action en fonction des produits de tarissement).
- ⇒ Recalculer exactement la date de remise dans le tank après vêlage (voir exemples dans l'encadré)

10 CONSEILS POUR BIEN TARIR !

1. Arrêter les concentrés individuels 8 jours avant la date prévue du tarissement pour faciliter la diminution de la sécrétion lactée.

2. Vérifier l'absence de mammites cliniques et subcliniques en réalisant des tests CMT (test tee-pol). Ne pas tarir si c'est le cas. Soigner l'infection impérativement avant.

3. Éviter que les vaches fraîchement tarées ne perdent leur lait. Les vaches sont des animaux très routiniers, il faut donc casser les habitudes quotidiennes de la vache et si besoin, utilisez des obturateurs externes.



4. Tarir sur une traite avec un traitement sélectif en fonction du degré d'infection de l'animal. Consultez l'historique "cellules" de l'animal et les indices (nouvelle infection et de guérison) fournis par JCE et faites le point avec votre technicien et votre vétérinaire.

5. Avoir des mains propres désinfectées ou porter des gants avant tout contact avec les trayons.

6. Injecter le produit antibiotique "hors lactation" après désinfection du bout des trayons avec **UNE** lingette désinfectante par trayon ou du coton + alcool et masser vers le haut du trayon sauf dans le cas d'un obturateur. Attention à ne pas enfoncer trop loin l'embout de l'applicateur pour ne pas traumatiser le trayon.

7. Post-tremper les 4 trayons avec un produit à effet barrière. Un post-trempage sera préféré à une pulvérisation.

8. Mettre les vaches à l'écart de l'ambiance de traite en les sortant du troupeau laitier.

9. Repérer les animaux traités par la pose d'un bracelet paturon ou par un signe distinctif afin d'éviter les erreurs.

10. Contrôler et gérer les facteurs de risques (hygiène du logement, vaches à risques, % de nouvelles infections.....) Si ces conditions ne sont pas réunies appliquer un obturateur obligatoirement.

Ensemble d'animaux : 35102008 0 Période étudiée du 17/03/15 au 28/10/16 Filtre TROUPEAU

Légende : CCI < 300 (vert), CCI >= 300 et < 800 (orange), CCI >= 800 (rouge), Absence de CCI (blanc), N° = Nombre de mammites

Year	N° travail	Lact.	Qualité SOK	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
				mar 15	avr 15	mai 15	juin 15	juil 15	août 15	sept 15	oct 15	nov 15	dec 15	jan 16	fév 16	mar 16	avr 16	mai 16	juin 16	juil 16	août 16	sept 16	oct 16	
FLUTE	4597	3	I I I	28	442	305	21	89	565															
COMTOISE	4498	5	I I O	272	538	50																		
COCONNELLI	4476	6	I I O	191																				
ALBEE	4437	7	I B I	169	161	277																		
ESLANTINE	4559	4	I S D	8	33	10	31	45	34	92	298													
ATLANTIDE	4442	7	I S S	36	48	37	40	36	70															
DOUCHEUSE	4519	5	I S S	352																				
HEUREUSE	4674	1	I - -																					
BURSONNET	4392	6	D I S	37	8	24	373	548	472	700	733	100	421	50										
MYRINE	4422	8	D O D																					
FAVORITE	4569	3	D O S	5	48	7	17	13	41	108	97	36	46	553	50									
FAROUCHE	4584	3	D O S	81	92	223	111	191	76	136														
FIFA	4566	3	O S S																					
ECLIPSE	4544	4	D S S	37	17	18	29	48	47	143														
DYNAMITE	4524	5	D S S																					
FRANCOISE	4567	3	O S S																					
GRINOTTE	4636	2	D S -	18	30	26	27	44	68															
GARONNE	4608	2	D S -	56	38	59	37	68	56															
HARMONICA	4668	1	D - -																					
JRS	4680	1	D - -																					
ONETTE	4540	4	S I O	11	7	10	23	407	226	296														
EGYPTE	4553	3	S I S																					
DYNAMO	4572	6	S D D	479																				
FLAQUETTE	4603	3	S D S	18	9	12	49	30	26	241	37	37												